

ALCAMICINA 5%

Ficha Técnica:

- Formulación:**

Cada mL contiene
Oxitetraciclina HCL: 50 mg.
Lidocaína: 1,0 mg.

- Clasificación:**

Antibiótico de amplio espectro.

- Indicaciones:**

Su espectro de acción se extiende a: *Bacillus spp*, *Erisipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Bordetella spp*, *Brucella spp*, *Francisella sp*, *Hemophilus spp*, *Yersinia spp*, *Campylobacter fetus*, *Borrelia spp*, *Leptospira spp*, *Fusobacterium spp*, *Mycoplasma spp*, *Chlamydia spp*, *Rickettsia*, algunos protozoarios, *Anaplasma spp* y *Ehrlichia spp*. Se puede utilizar en bovinos, porcinos, equinos, caprinos, ovinos, caninos y felinos.

- Administración y dosis:**

Vía intramuscular profunda. Aplicar de 1 – 2 mL por cada 10 Kg de peso cada 12 horas.

- Recomendaciones:**

Tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano: 28 días. Tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y el destino de la leche para consumo humano: 72 horas.

- Presentación:**

Frascos con 20, 50, 100, 250 y 500 mL.



Alcamicina 5%

Ovejas y porcinos	10 mL/50 Kg cada 12 hrs.
Terneros, potrillos, corderos y lechones	10-20 mL/50 Kg cada 12 hrs.
Caninos y felinos	1.5 mL/10 Kg cada 12 hrs.
Bovinos y equinos	20 mL/100 Kg cada 12 hrs.
Tratamiento de Endometritis (*)	Dilución
Endometritis leve	20 mL/40 mL de agua estéril o suero
Endometritis crónica	40 mL/40 mL de agua estéril o suero

(*) Lavados intrauterinos

Oxitetraciclina + Lidocaína

Beneficios:

- Antibiótico de amplio espectro indicado contra bacterias, micoplasmas, rickettsias y protozoarios.
- Recomendado para infecciones en el sistema respiratorio, digestivo, piel, genitourinario y hemoparásitos (carrión, toxemia, pioplasma, entre otros).
- Rápida absorción y distribución asegurando una respuesta terapéutica.
- Contiene lidocaína para reducir el dolor de la inyección.

Administración y dosis:

Intramuscular profunda. 1 ó 2 mL por cada 10 kg de peso cada 24 horas. Repetir por 5 días seguidos o según criterio del médico Veterinario.

Lavados intrauterinos: 20-40 mL/ 40 mL de agua estéril o suero.

Presentación: Frascos de 20, 50, 100, 250 y 500 mL.



N.º: 4020-0004 / 4020-0006 / 4020-0007 • ventas@reinsa.com • www.reinsa.com • @reinsa División Veterinaria

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala

Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645

Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt

