

PARASITOL 500 EC

Ficha Técnica:

- **Formulación:**

Cada 100 mL contiene:
Diclorvos (DDVP): 500 g.
Vehículo c.s.p.



- **Clasificación:**

Antiparasitario de uso externo en bovinos y control de plagas en ambientes.

- **Indicaciones:**

Recomendado para el control de tórsalos y garrapatas en bovinos. También, en fumigaciones en establos, bodegas, granjas, casas y jardines para el control de diferentes plagas como pulgas, garrapatas, cucarachas, hormigas, polillas, comején, alacranes, criaderos de mosquitos, entre otros.

- **Administración y dosis:**

Para aplicación por aspersión la dosificación es 2 mL por litro de agua.

- **Beneficios:**

- Altamente efectivo.
- De fácil preparación.
- De acción inmediata.
- No residual por lo que no daña el ambiente.

- **Recomendaciones:**

- En caso de intoxicación el antídoto es el Sulfato de Atropina.
- Mantenga las medidas de seguridad para este tipo de productos.
- El período de retiro es de 30 días en carne.
- Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no mayor a 30° centígrados y lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado.

- **Presentación:**

Emulsión concentrada en envases de 60, 120, 180 y 1000 mL.

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645
Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt



PARASITOL 500 EC

Parasitol® 500 EC

Control absoluto de garrapatas y tórsalos en bovinos,
además de otras plagas en ambientes infestados.

Composición:

Cada 1000 mL contienen:
Diclorvos 500 g
Vehículo emulsificable c.s.

Indicaciones:

Recomendado para el control de garrapatas, tórsalos y otras plagas en fincas. Indicado para la fumigación en ambientes infestados y granjas, eliminando moscas, pulgas, cucarachas, hormigas, avispas, polillas, comején, alacranes, etc.

Forma de uso en animales:

Aplicar por baño de aspersión.

Dosificación:

Para aplicación por aspersión mezclar 2 mL por cada litro de agua ó 40 mL por cada 20 litros de agua (40 mL por bomba de 20 litros).
• Nunca bañar animales asoleados, agitados o cuando se presenten altas temperaturas.

Antídoto:

Sulfato de Atropina.

Fumigación en ambientes infestados:

Mezclar 2 mL por cada litro de agua y aplicar sobre las áreas donde se localiza la plaga como en orillas, hendidias, debajo de artefactos / utensilios o donde se escondan los insectos o arácnidos.

Medidas de precaución y auxilio:

- Almacenar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Mantener las áreas ventiladas y utilizar equipos de protección como: mascarillas, guantes, delantal y zapatos impermeables.
- Retirar sus mascotas a la hora de aplicar el producto.
- El área fumigada puede ser reutilizada hasta 8 horas después, previa ventilación.
- Leer la etiqueta antes de usar.

Presentaciones:

1000 mL
180 mL
120 mL
60 mL



Contáctenos: (506) 4035-1900 - 4035-1906 - 4035-1907 • www.alcames.com

contactenos@alcames.com

 Alcames División Veterinaria


DIVISIÓN VETERINARIA

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645
Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt



PARASITOL 500 EC

Parasitol® 500 EC

Control absoluto de garrapatas y tórsalos en bovinos,
además de otras plagas en ambientes infestados.



Desparasitante de uso
externo para bovinos
y el control de plagas en
ambientes infestados.

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645
Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt

