

LEVAMISOL 10% SOBRE

Ficha Técnica:

- Formulación:**

Cada 100 g. contiene:
Levamisol HCL: 11.79 g.

- Clasificación:**

Desparasitante interno en polvo.

- Indicaciones:**

Desparasitante interno que elimina larvas y parásitos adultos gastrointestinales y pulmonares más comunes en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves.

- Administración y dosis:**

Aplicación vía oral en el alimento o disuelto en agua.

- Recomendaciones:**

Se recomienda cambiar las porciones no ingeridas después de 72 horas. No se recomienda el uso del levamisol en vacas en el primer trimestre de preñez, debido a que por sus eventuales efectos colinérgicos puede provocar aborto. Tampoco se recomienda su uso en vacas lactantes.

Antídoto:

Sulfato de atropina, inhibidor de la acetilcolinesterasa.

Período de retiro:

Carne: 2 días.

Huevos: 2 días.

- Presentación:**

Cajas conteniendo 50 sobres de 15 g cada uno.



Levamisol 10% en polvo

Bovinos, ovinos y caprinos	1 sobre (15 g.) por cada 200 Kg de peso vivo
Porcinos	1 sobre (15 g.) por cada 200 Kg de peso vivo. Para efecto ascaricida 2 sobres cada 200 Kg.
Aves	En granjas pequeñas se mezcla 1 sobre (15 g.) con la comida o con el agua de beber de cada grupo de aves hasta un peso vivo total de 24 Kg (17 gallinas adultas)

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala

Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645

Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt



LEVAMISOL 10% SOBRE

Levamisol 10%

Desparasitante Interno en polvo



Formulación: Cada 100 g. contienen:
Levamisol HCL: 11.79 g.

Categoría: Desparasitante interno en polvo.

Indicaciones: Desparasitante interno que elimina larvas y parásitos adultos, gastrointestinales y pulmonares más comunes en aves, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Administración y Dosis: Aplicación vía oral en el alimento o disuelto en agua.

Bovinos, ovinos y caprinos	1 sobre (15 g.) por cada 200 Kg de peso vivo.
Porcinos	1 sobre (15 g.) por cada 200 Kg de peso vivo. Para efecto ascáricida: 2 sobres cada 200 Kg.
Aves	En granjas pequeñas se mezcla 1 sobre (15 g.) con la comida o con el agua de beber de cada grupo de aves hasta un peso vivo total de 25 Kg (17 gallinas adultas)

Recomendaciones: Se recomienda cambiar las porciones no ingeridas después de 72 horas. No se recomienda el uso del levamisol en vacas en el primer trimestre de preñez debido a que por sus eventuales efectos colinérgicos puede provocar aborto. Tampoco se recomienda su uso en vacas lactantes.

Antídoto: Sulfato de atropina, inhibidor de la acetilcolinesterasa.

Período de retiro: Carne: 2 días.
Huevos: 9 días.

Presentación:
Cajas conteniendo
50 sobres de 15 g
cada uno.



Contáctenos: (506) 4035-1906 - 4035-1907 • contactenos@alcames.com •  Alcames División Veterinaria

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645
Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt



LEVAMISOL 10% SOBRE

Levamisol 10%

Desparasitante Interno en polvo



Desparasitante interno en polvo que elimina larvas y parásitos adultos, gastrointestinales y pulmonares más comunes en aves, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645
Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt

